

Tratamiento quirúrgico de una luxación inferior de cadera de 3 meses de evolución en una región en vías de desarrollo



Raúl García Rodríguez, Ana María Martín Fuentes, Celia Castillo, Lucía Fito Jordán, Cristina Jiménez Nava. **CIRUGIA EN TURKANA**

OBJETIVOS

Describir el caso y el tratamiento llevado a cabo en un paciente joven que presentaba una luxación inferior crónica de cadera en un medio de escasos recursos como es la región de Turkana (Kenia)

MATERIAL Y METODOS

Valorado en las consultas del Hospital de Lodwar (Kenia) durante la XX campaña de la ONG Cirugía en Turkana

- 22 años de edad
- Dolor, cojera e impotencia funcional en cadera derecha de 3 meses de evolución tras saltar desde un muro

TAC : luxación inferior con impactación de cabeza femoral que se encuentra alojada a nivel del agujero obturador.

RESULTADOS

Se decide tratamiento quirúrgico mediante reducción abierta debido a la cronicidad del caso. El cotilo se encuentra completamente ocupado por material fibrótico y la cabeza femoral presenta una impactación superoexterna producida por el reborde inferior de la lámina acetabular .

- Tras conseguir la reducción, la cadera permanece estable hasta los 120º de flexión.

CONCLUSION

La luxación inferior de cadera es una patología poco frecuente. Su presentación crónica es aún mas rara y su observación en nuestro medio es excepcional. Las posibilidades de tratamiento en países en vías de desarrollo puede limitar su manejo y ensombrecer su pronóstico.

Cirugía en Turkana es un Proyecto de Cooperación Internacional que nace en 2004.

Su objetivo principal es dar asistencia quirúrgica especializada a la población de Turkana, en el Norte de Kenia que es una zona con un elevado índice de pobreza y una enorme escasez de recursos sanitarios.

[www. cirugiaenTurkana .com](http://www.cirugiaenTurkana.com)

