

Fractura diafisaria de húmero sobre luxación inveterada ¿Cómo lo tratamos?


Simón Ochoa, M. Barrio Velasco, M.J., Moussallem González J., Fernández de Torres M., Mesías de Concepción, S.
Complejo Asistencial de Zamora. España.

OBJETIVOS

Presentar el tratamiento llevado a cabo en una fractura diafisaria de húmero sobre una luxación inveterada de hombro tras haber realizado una búsqueda en la literatura de la asociación de ambas patologías y habiendo aplicado el concepto de *skilful neglect* como parte del mismo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Mujer de 82 años, deambulante con andador → caída → fractura diáfisis humeral sobre una luxación inveterada.



Revisión bibliográfica tratamientos : escasa la literatura.

Decisión terapéutica basada en funcionalidad previa, comorbilidades y expectativas

→ Síntesis de la fractura mediante técnica MIPO y la abstención terapéutica para la luxación inveterada (skilful neglect).


RESULTADOS

La paciente fue dada de alta por el servicio de rehabilitación a los 10 meses de la intervención.

Flexo-abducción 0-90° sin dolor.

Recuperación de actividad previa a la fractura.

**Afectación de nervio radial durante la cirugía, con recuperación a partir de la semana 22.*



CONCLUSIONES

- Baja prevalencia de luxaciones inveteradas en nuestro medio
- Luxación inveterada + Fractura diafisaria → Asociación POCO frecuente
- **NO** existe un tratamiento estandarizado en la actualidad
- Valoración de riesgo/beneficio
- Tratamiento INDIVIDUALIZADO



61 CONGRESO
secot

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

