

FRACTURA DE ACROMION

AMAIA LANDETA GULLÓN, IÑIGO ZUBIETA GONZALO, JAVIER FAUS COTINO, IÑIGO SAIZ RODRIGUEZ,
CRISTINA PAREJA FRADE

OBJETIVOS

Las fracturas traumáticas de acromion son patologías muy poco frecuentes, que suelen presentar lesiones asociadas. Estas fracturas representan un 8% de las fracturas escapulares, y 1% de todas las fracturas en general. El objetivo, es exponer el manejo quirúrgico de un paciente con una fractura de acromion.

CASO CLÍNICO

Varón de 75 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor en hombro derecho tras caída con traumatismo sobre el mismo. En la radiografía inicial se objetiva una fractura de acromion (Clasificación de Kuhn tipo II) derecha. Ante hallazgo, se decide tratamiento quirúrgico, realizándose una reducción abierta y fijación interna con 2 agujas de Kirschner de 1,8mm y cerclaje en obenque. Se realiza inmovilización con cabestrillo durante las dos primeras semanas, limitando abducción y flexión superior a 45º, con recomendación de iniciar ejercicios pendulares.



RESULTADOS

En el momento actual el paciente presenta una correcta consolidación radiográfica y buena evolución clínica, pudiendo realizar antepulsión del miembro afecto a 90º, rotación externa a oreja con antepulsión de codos y rotación interna a L2. Actualmente, se encuentra en tratamiento con Rehabilitación.

CONCLUSIONES

Las fracturas traumáticas de acromion son patologías muy poco frecuentes, por lo que la literatura que encontramos sobre el manejo de la misma es escasa. Aunque la fijación con cerclaje en obenque tenga una tasa elevada de fallo de material y pseudoartrosis, por el momento nuestro paciente está presentando un resultado clínico-radiológico adecuado y ha conseguido retomar sus actividades diarias sin dolor.