

Movilización de dispositivo intersomático. en paciente con listesis. A propósito de un caso

Mínguez, H., Zuil, P., Simón A., Ferrete A.

Objetivo:

Presentar la resolución de un caso que presentó movilización de un dispositivo intersomático tras artrodesis columna lumbar

Material y Metodología

Mujer 56 años. Dolor lumbar irradiado a MMII. Diagnosticada de estenosis canal L3-L5 y listesis grado II L5-S1. Se realiza descompresión, reducción de listesis y artrodesis circunferencial L3-S1. A los 3 meses acude por reaparición de dolor. En pruebas complementarias se aprecia Listesis grado I L5-S1 y movilización de intersomático.



Resultados

Se reinterviene realizando abordaje anterior, extracción de intersomático y artrodesis tipo ALIF.

El postoperatorio cursa sin complicaciones.

En seguimiento en consulta presenta molestia leve en glúteo izquierdo sin déficit neurológico ni otras complicaciones.



Conclusiones

La movilización de un dispositivo intersomático es una complicación poco frecuente y de difícil resolución.

Dada la dificultad de extracción por vía posterior por riesgo de lesión radicular, optamos por el abordaje anterior, más seguro y con mejor riesgo de complicaciones neurológicas. A pesar de la dificultad para la extracción del dispositivo previo, el resultado fue satisfactorio.