

PSEUDOARTROSIS DE PERONÉ CON DEFECTO CUTÁNEO TRATADA CON CLAVO DE PERONÉ DISTAL.

Almena Rodríguez, Pablo⁽¹⁾; García García, Javier Minaya⁽¹⁾; Diez Rodríguez, Jesús⁽¹⁾; Espinel Riol, Alberto⁽¹⁾; Diez del Corral Revilla, María de los Ángeles⁽¹⁾.
⁽¹⁾Hospital Universitario Río Hortega

OBJETIVOS

- Presentar caso de paciente con pseudoartrosis de peroné distal derecho y pérdida de sustancia en maléolo externo con exposición de material de osteosíntesis tras fractura bimalleolar de tobillo derecho.

MATERIAL Y METODOLOGÍA

- Varón de 25 años.
- Abril de 2021 → RAFI fractura bimalleolar de tobillo derecho.
- Septiembre de 2021 → TC diagnóstico de pseudoartrosis de peroné → 2ª IQ osteosíntesis + injerto óseo.
- Junio de 2023 → 3ª IQ reosteosíntesis + autoinjerto óseo.
- Agosto 2023 → derivado a nuestro servicio → IQ conjunta con C. Plástica: reosteosíntesis con clavo de peroné distal cerrojado + aloinjerto óseo + colgajo peroneo brevis.



RESULTADOS

- 1 mes postcirugía → signos radiográficos de consolidación ósea. Sin dolor y buen balance articular.



- 2 meses postcirugía → comienzo de carga.



- 6 meses postcirugía → alta definitiva tras realizar rehabilitación con signos de consolidación ósea y recuperación funcional completa.



CONCLUSIONES

- Enclavado de peroné: útil en casos que requieran de una mínima agresión de partes blandas.
- Existe bibliografía reciente que afirma mejores tasas de consolidación que la osteosíntesis con placa, por lo que puede ser de utilidad en casos de pseudoartrosis.