

ENFERMEDAD DE MÜLLER – WEISSLLA IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO PRECOZ. A PROPÓSITO DE DOS CASOS Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Pérez Iglesias J., Saavedra Rodríguez R., Mirón Domínguez A., Ruiz Toro A., García-Herrera Cruces C.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Müller- Weiss es una enfermedad poco frecuente, en la cual se observa alteraciones en escafoides tarsiano. La etiología es incierta, teoría más aceptada actualmente, propuesta por Maceira, combina un retraso en la osificación del escafoide sumado a una distribución no uniforme de las fuerzas de compresión, centradas en la cara lateral del escafoide. Suele presentarse como un “pie plano paradójico”, pie plano con varo de retropié, que puede evolucionar a artrosis de las articulaciones periescafoideas. El tratamiento quirúrgico, se basa en múltiples artrodesis o corrigiendo el varo de retropié, como por ejemplo, con una osteotomía de calcáneo que es lo más aceptado en el momento actual. El objetivo de nuestro estudio, es describir dos pacientes con tratamiento distintos, ver resultados y realizar revisión bibliográfica.



MATERIAL Y MÉTODOS

Caso 1 Mujer de 58 años derivada de otro centro, diagnosticada de Muller-Weiss tratada en 2020 mediante artrodesis periescafoidea (astrágalo-escafo-cuneana) en 2 ocasiones y que es fallida tanto clínica como radiológicamente. Ante esta situación se realiza en 2021 artrodesis columna interna + subatlar + calcáneo-cuboidea. Ante la persistencia de dolor, se realiza nuevo TAC, donde se observa artrosis tibio-talar grado III, que precisa, en 2023, de una artrodesis tibio-talar con 2 tornillos. Caso 2 mujer de 61 años acude a consulta por dolor en cara externa de pie, limitación en la dorsi-flexión y pie plano con varo de retropié, se opta por tratamiento quirúrgico, realizándose en enero de 2024 osteotomía de Dwyer y fijación con dos tornillos canulados + Koutsogiannis.

RESULTADOS

Caso 1, la paciente persiste con dolor y déficit de la flexo-extensión, refiere molestias del material de osteosíntesis. Radiográficamente se observan consolidadas las artrodesis.
Caso 2 En el seguimiento ya con carga, refiere disminución del dolor. Radiográficamente se observa consolidación de la osteotomía y no se ve un aumento de la necrosis del escafoide.



CONCLUSIONES

La enfermedad de Muller-Weiss, precisa de un diagnóstico y tratamiento rápido y adecuado, se ha observado tanto en la experiencia de estos casos como en los múltiples estudios publicados, que comenzar con una corrección del varo de retropié con una osteotomía del calcáneo puede ser una buena opción terapéutica.