

DE UNA DACTILITIS USUAL AL DIAGNÓSTICOS DE UN ADENOCARCINOMA PULMONAR. A PROPÓSITO DE UN CASO

Pérez López, José David; Torres Torres, Miguel; Briso-Montiano Pinacho, Ricardo; San José Pardo, Íñigo; Mora Simón, Carlos Alberto

COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE PALENCIA

INTRODUCCIÓN

Las **acrometástasis** se definen como metástasis distales a codos y rodillas. Son infrecuentes y representan entre 0.1-3% de los casos en contexto de una enfermedad metastásica diseminada. Su presentación como primer signo de una enfermedad metastásica es extremadamente rara. Las acrometástasis en miembro inferior suelen sugerir neoplasias de origen colorrectal y urogenital.

CASO CLÍNICO

Varón de 67 años, exfumador, con arteriopatía periférica con dolor de 2 meses de evolución en 4º dedo de pie derecho.

Acudió varias veces a Urgencias donde se pautó antibiótico, antiinflamatorios e hipouricemiantes con evolución insatisfactoria. Asocia síndrome constitucional.

A la exploración presenta tumefacción de coloración violácea, caliente, hiperalgesia al roce, hipoestesia dorsal y sufrimiento cutáneo severo. Se solicitó una ecografía la cual informaba de una masa sólida irregular con alteración de la ecogenicidad y una radiografía de tórax que objetivó una masa pulmonar apical derecha sugestiva de proceso neofornativo.

En conjunto con el S. Oncología se decidió realizar una intervención quirúrgica como medida paliativa por dolor incoercible. Se realizó biopsia excisional y amputación 4º radio de pie derecho.

RESULTADOS

El postoperatorio inmediato fue excelente, consiguiendo una mejoría clínica muy satisfactoria. Posteriormente se realizó una broncoscopia con toma de biopsias compatibles con adenocarcinoma de pulmón. Actualmente el paciente se encuentra en tratamiento con quimioterapia e inmunoterapia a pesar de lo cual presenta nuevamente dolor en dorso del pie y hombro derecho por una nueva metástasis en escápula.

CONCLUSIONES

- Importancia de una historia clínica completa y una exploración minuciosa para un diagnóstico precoz.
- Ante un caso de dolor constante, progresivo y refractario al tratamiento descartar la posible existencia de un tumor primario.
- En miembros superiores el tumor más frecuente es el pulmonar, mientras que en miembros inferiores el colorrectal y genitourinario.

