2 AÑOS DE FRACTURAS-AVULSIÓN DE LA TUBEROSIDAD TIBIAL ANTERIOR: INFORME FUNCIONAL DE 4 ADOLESCENTES

Carlota Nóbrega[1], Nuno Campos Conceição[2], Tiago Pereira[3], Eva Campos Pereira[2]
1. Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, Cascais, Portugal
2 . Hospital Central do Funchal Dr. Nélio Mendonça, Funchal, Portugal
3. Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal

INTRODUCCIÓN

Lesiones pediátricas raras → • 1% de las fracturas-epifisiolisis • 3% de las fracturas de la tibia proximal → Adolescentes varones que practican deporte con saltos frecuentes → 4 casos diferentes de esta entidad → Resaltar la importancia de su diagnóstico y tratamento adecuado

CASOS CLÍNICOS Y RESULTADOS

4 adolescentes varones → • Dolor de la parte anterior de la rodilla • Impotencia funcional • Edema → Lesión consecuencia del salto em deportes

• J.R. • Varón • 14 años → Odgan 1A → Tratamento conservador

Preoperatorio

1 año y 7 meses

• A.G. • Varón • 15 años → Odgan 2A → • Reducción cruenta • Fixación con tornillos canulados • Movilización con yeso

Preoperatorio → Perda de seguimento

	J.R.	A.G.	N.P.	A.S.
Kujala	95%	-	89%	50%
LKS	100%	-	90%	52%
TAL	7	-	3	1
PGIC	2	-	5	5

• N.P. • Varón • 16 años → Odgan 3A → • Reducción cruenta • Fixación con tornillos canulados • Movilización con yeso

Preoperatorio

6 meses

• A.S. • Varón • 17 años → Odgan 3A → • Reducción cruenta • Fixación con tornillos canulados • Movilización con yeso

Preoperatorio

2 meses

CONCLUSIÓN

Lesiones pediátricas raras → Diagnóstico y tratamento a su tiempo → Muy buen pronóstico • Recuperación rápida • Buen resultado funcional • Sin complicaciones importantes → Tasa de complicaciones del 28% → • Bursitis • Síndrome compartimental • Recurvatum